

Qué hacer cuando su hijo tiene fiebre



Use un termómetro para saber si su hijo tiene fiebre

Hay cuatro métodos para tomar la temperatura: rectal, oral, por oído o axila. Las instrucciones incluidas con su termómetro le indicarán el método que debe usar.

Antes y después de cada uso, limpie la punta del termómetro. Use agua y jabón, o frote con alcohol, y luego enjuague con agua fría. No use el mismo termómetro para tomar temperatura oral y rectal.

Método que debe usarse para el termómetro (por edades)

Del nacimiento hasta los 3 meses

Solamente rectal

3 meses a 4 años

Axilar o rectal

4 años en adelante


Oral, axilar o por oído

En niños, tener fiebre es:

Axilar*	de 99.0 F (37.2 C) o más
Oral	de 100.0 F (37.8 C) o más
Rectal	de 100.4 F (38 C) o más
Por oído	de 100.4 F (38 C) o más

Si tiene termómetro digital por oído

- Úselo únicamente si su hijo tiene 6 meses de edad o más
- La cerilla, o un canal auditivo muy curvado, pueden disminuir su exactitud



En caso de duda de los resultados, tome la temperatura rectal



Cómo tratar la fiebre

- Aunque la fiebre es síntoma de una enfermedad, también puede ayudar combatir infecciones
- Podría ser innecesario tratar la fiebre en un bebe que tenga más de seis meses y está durmiendo bien, tomando suficiente líquidos, y que puede jugar

Del nacimiento hasta los 3 meses

No dé medicamentos a su hijo antes de que lo revise el doctor

3 meses a 4 años

Tylenol
(Acetaminofeno)
Nunca dé más de lo recomendado en la etiqueta

4 años en adelante

Advil o Motrin pediátrico
(Ibuprofeno)
Siga las instrucciones de la etiqueta

Nunca le de aspirina a cualquier niño de 18 meses de edad o menos
Consulte al médico antes de dar medicamentos a sus hijos





¿Tiene alguna pregunta sobre la salud?
Línea de asesoramiento de enfermería de HPSM
1-833-846-8773



Obtendrá respuestas 24/7 de enfermeros matriculados y registrados

Cuándo solicitar atención médica

Llame al médico si:

-  Su hijo ha tenido fiebre por 3 días o más y no se mejora
-  Su hijo tiene fiebre, está vomitando, tiene diarrea y no toma muchos líquidos, o si orina menos y se está debilitando

Acuda a la sala de emergencias inmediatamente si:

-  Su hijo tiene 3 meses de edad o menos, y tiene una temperatura de 100.4 F (38 C) o más
-  Tiene dificultad para respirar